

BK07

Sand- und Silikatmagerrasen

Bedingungen für die Erfassung im Kataster: (siehe auch Steckbrief des BK07 - Anhang 11 der Kartieranleitung)

1. Mindestgröße bei Erfassung: 100 m

Typisches Arteninventar: bitte Häufigkeiten angeben (selten=s, vereinzelt=v, zerstreut=z, häufig=h, aspektbildend=a)

Häufige Arten**:

- ☐ *Agrostis capillaris*
- ☐ *Festuca rubra*
- ☐ *Plantago lanceolata*

**Häufige Arten werden bei der Bewertung nicht mitgezählt.

Kenn- und Trennarten:

- ☐ *Aira caryophylla*
- ☐ *Aira praecox*
- ☐ *Anthemis arvensis*
- ☐ *Arabis glabra*
- ☐ *Arenaria serpyllifolia*
- ☐ *Briza media*
- ☐ *Campanula rapunculus*
- ☐ *Campanula rotundifolia*
- ☐ *Centaurea jacea coll.*
- ☐ *Cerastium arvense*
- ☐ *Cerastium brachypetalum*
- ☐ *Cerastium semidecandrum*

- ☐ *Corynephorus canescens*
- ☐ *Cytisus scoparius*
- ☐ *Danthonia decumbens*
- ☐ *Deschampsia flexuosa*
- ☐ *Dianthus armeria*
- ☐ *Dianthus deltoides*
- ☐ *Echium vulgare*
- ☐ *Erodium cicutarium*
- ☐ *Erophila verna*
- ☐ *Festuca ovina agg*
- ☐ *Galium saxatile*
- ☐ *Galium verum*
- ☐ *Genista pilosa*
- ☐ *Genistella sagittalis*
- ☐ *Hieracium pilosella*
- ☐ *Hypericum maculatum*
- ☐ *Hypochoeris radicata*
- ☐ *Jasione montana*
- ☐ *Koeleria macrantha*
- ☐ *Lathyrus linifolius*

- ☐ *Luzula campestris*
- ☐ *Myosotis discolor*
- ☐ *Myosotis stricta*
- ☐ *Ornithopus perpusillus*
- ☐ *Orobancha alba*
- ☐ *Orobancha purpurea*
- ☐ *Orobancha rapum-genistae*
- ☐ *Papaver argemone*
- ☐ *Papaver dubium*
- ☐ *Phleum phleoides*
- ☐ *Pimpinella saxifraga*
- ☐ *Poa compressa*
- ☐ *Polygala vulgaris*
- ☐ *Potentilla argentea*
- ☐ *Potentilla erecta*
- ☐ *Potentilla neumanniana*
- ☐ *Rumex acetosella*
- ☐ *Scleranthus perennis*
- ☐ *Sedum acre*
- ☐ *Sedum forsterianum*

- ☐ *Sedum rupestre*
- ☐ *Silene latifolia ssp. alba*
- ☐ *Stachys officinalis*
- ☐ *Teesdalia nudicaulis*
- ☐ *Trifolium arvense*
- ☐ *Trifolium campestre*
- ☐ *Veronica officinalis*
- ☐ *Viola riviniana*
- ☐ *Viola tricolor*

Unterstrichene Arten: Seltene, stark gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Arten, deren Populationen besonders zu schützen sind.

Beeinträchtigungen

Sonstige:

Neophyten / Invasive Arten bitte Häufigkeiten angeben (selten=s, vereinzelt=v, zerstreut=z, häufig=h, aspektbildend=a)

Pflanzen

Tiere / Fungi

Störzeiger

Die wichtigsten abwertenden Arten: Störzeiger (z.B. Zeiger für Verbuschung => Bäume/Sträucher, Einsaat, Düngung, Befahrung, Tritt/Überbeweidung)

Maßnahmenvorschläge:

- | | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Mahd einschürig | <input type="checkbox"/> Beweidung, <u>schlagbezogen</u> : | <input type="checkbox"/> Entfernen einzelner Gehölze | <input type="checkbox"/> Reduktion invasiver Arten |
| <input type="checkbox"/> Turnus (Mahd): _____ | <input type="checkbox"/> Rinder <input type="checkbox"/> Schafe <input type="checkbox"/> Ziegen | <input type="checkbox"/> Entbuschung, flächig | <input type="checkbox"/> Beseitigung von Ablagerungen / Verunreinigungen |
| <input type="checkbox"/> 1. Schnittmonat: _____ | <input type="checkbox"/> Turnus Beweidung: _____ | <input type="checkbox"/> Entbuschung, selektiv | <input type="checkbox"/> Extensivierung umliegender Offenlands |
| <input type="checkbox"/> Mahd nur mit Handgerät/ Spezialmaschinen | <input type="checkbox"/> 1. Weidemonat: _____ | <input type="checkbox"/> Wechselnde Teilbereiche aus Pflege/Nutzung aussparen | <input type="checkbox"/> Sonstige: |
| | <input type="checkbox"/> Saisonbeweidung (mit Pausen) | <input type="checkbox"/> Besucherlenkung | |
| | <input type="checkbox"/> Hoher Besatz über kurze Zeit | | |
| | <input type="checkbox"/> Wander-/Hütebeweidung | | |