

6110**Pelouses pionnières à orpins**

Condition pour le recensement en tant que biotope protégé :

1. Présence de végétation typique

Ne sont pas pris en compte : les peuplements fortement embroussaillés.

Les peuplements à végétation fermée sont classés dans les pelouses calcicoles.

Inventaire des espèces typiques:

veuillez indiquer la fréquence (rare = s, épars = v, régulier = z, fréquent = h, dominant = a)

Espèces typiques :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> <i>Alyssum alyssoides</i> | <input type="checkbox"/> <i>Saxifraga tridactylites</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Cerastium brachypetalum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum acre</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Cerastium pumilum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum album</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Holosteum umbellatum</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum forsterianum</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Melica ciliata</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum rupestre</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Minuartia hybrida</i> | <input type="checkbox"/> <i>Sedum sexangulare</i> |
| <input type="checkbox"/> <i>Poa bulbosa</i> | <input type="checkbox"/> <i>Teucrium botrys</i> |

Espèces soulignées : espèces rares, fortement menacées ou en danger d'extinction, dont les populations doivent bénéficier d'une protection particulière.

Structures**Éléments structurels typiques** : formations rocheuses avec différentes structures (bandes rocheuses, surplombs, éperons rocheux, éboulis, débris fins), végétation basse et clairsemée (*Alyssum-Sedum albi*), communautés de mousses et de lichens, éventuellement quelques buissons et endroits ouverts au sol.**Pressions** (veuillez marquer toutes les pressions constatées qui sont pertinentes pour l'évaluation)Dépôt : p. ex. rémanents de coupe (= résidus suite à une éclaircie), fumier, balles de foin/paille, gravats, ordures, etc.Activités récréatives : pressions causées par l'équitation, les sports moteurs, les sports nautiques, la randonnée, la spéléologie, l'escalade, etc.Apport en fertilisants : ancien ou récent, sur la surface ou provenant de surfaces voisinesDégâts de gibier : p. ex. abrutissement, dégâts de frayage ou d'écorçage, dégâts de piétinement et de fouissement (sangliers)**Mesures de gestion et de restauration** : (veuillez cocher)

- | | | | |
|---|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> Fauchage, une fois par an | <input type="checkbox"/> Pâturage, en fonction de la parcelle : | <input type="checkbox"/> Suppression de certains ligneux | <input type="checkbox"/> Réduction des espèces invasives |
| <input type="checkbox"/> Rotation (fauchage) : _____ | <input type="checkbox"/> Bovins <input type="checkbox"/> Ovins <input type="checkbox"/> Caprins | <input type="checkbox"/> Débroussaillage surfacique | <input type="checkbox"/> Élimination des dépôts/polluants |
| <input type="checkbox"/> 1er mois de fauche : _____ | <input type="checkbox"/> Rotation, pâturage : _____ | <input type="checkbox"/> Débroussaillage partiel | <input type="checkbox"/> Extensification du milieu ouvert environnant |
| <input type="checkbox"/> Fauchage uniquement manuel/machine spéciale | <input type="checkbox"/> 1er mois de pâturage : _____ | <input type="checkbox"/> Epargner certaines zones variables de toute gestion/utilisation | <input type="checkbox"/> Autre : |
| <input type="checkbox"/> Création de nouveaux sites pionniers - sous-surfaces variables | <input type="checkbox"/> Pâturage saisonnier (avec pauses) | <input type="checkbox"/> Gestion des flux de visiteurs | |
| | <input type="checkbox"/> Forte charge de bétail sur une courte période | | |
| | <input type="checkbox"/> Pâturage itinérant | | |

Remarques :

- Indiquer la ou les espèce(s) invasive(s) rencontrée(s)
- Observations d'espèces (annexe II, IV et V de la directive « Habitats » ou annexe I de la directive « Oiseaux », liste rouge du Luxembourg)
- Autres mesures de gestion et de restauration
- Suggestions d'amélioration de la fiche de relevé (p. ex. espèces manquantes/superflues)