

Beifußblättriges Traubenkraut - *Ambrosia artemisiifolia*

Ambrosie à feuilles d'armoise - Common ragweed



Invasive gebietsfremde Arten - Merkblatt

Synonyme:

Ambrosia, Wilder Hanf

Herkunft:

Nordamerika

Lebensraum:

Äcker, Straßenränder Gärten, Ruderalstellen

Status:

ISEIA-LUX: C1 = keine Liste

Unionsliste der EU-Verordnung Nr. 1143/2014: nein


Vegetative Periode und Blütezeit:

Juli bis August und August bis Oktober

Einführungsweg:

Importierte kontaminierte Körner und Saatgut
(Vogelfuttermischungen, Saatgut)

Verbreitung:



Merkmale



© Qwert1234 / CC



© Meneerke bloem

Das Beifußblättrige Traubenkraut wird bis zu 2 m hoch. Die Stängel sind behaart und färben sich mit zunehmendem Alter rötlich.

Die Blätter sind fiederspaltig, behaart und beidseitig dunkelgrün.

Während sie an der Basis gegenständig angeordnet sind, wachsen die Blätter in der oberen Hälfte wechselständig.

Beim Zerdrücken verbreiten die Blätter keinen Geruch.

Ähnliche Arten

Verschiedene Arten ähneln dem Beifußblättrigen Traubenkraut. Es handelt sich um folgende Arten:

Einheimische Arten

Gemeiner Beifuß

Artemisia vulgaris

Stängel komplett rötlich

Geteilte und alternierende Blätter

Innenseite der Blätter weiß-silbern



© A. J. T. Johnsingh

Einjähriger Beifuß

Artemisia annua

Unbehaarter, leicht rot gemaserner Stängel

Vielgeteilte Blätter, hellgrüne Farbe

Starker Geruch der zerriebenen Blätter



© Kristian Peters

Referenzen und Zusatzinformationen

<https://neobiota.lu/ambrosia-artemisiifolia/>

<http://www.nonnativespecies.org/>

<http://www.ambrosie.info>

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambrosia_artemisiifolia_080908.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ambrosia_artemisiifolia_inflorescence02.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artemisia_vulgaris_AJTJ.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Artemisia_annua.jpeg

