

Raton laveur - *Procyon lotor*

Wäschbier - Waschbär - Raccoon



Espèces exotiques envahissantes - Fiche d'identification

Origine:

Amérique du Nord et centrale

Habitats:

Préférentiellement au bord de cours d'eau avec des forêts de feuillus.

Régime alimentaire:

Omnivore ses préférences varient au fil des saisons. Alimentation plutôt carnée au printemps (grenouilles, moules, oisillons...), puis fruits, baies et graminées le reste de l'année.

Longévité:

Environ 5 années.

Statut:

ISEIA-LUX: C3 = pas classé

Liste EEE préoccupantes pour l'Union: oui (2016).


Reproduction:

Accouplements entre janvier et février. La femelle n'a qu'une seule portée par an donnant naissance à 2 à 8 ratonneaux entre avril-mai.

Maturité sexuelle:

Les ratons laveurs sont matures sexuellement entre 1-2 an(s).

Distribution:



Voie d'introduction:

Introduction volontaire par des lâchers dans la nature.

Caractéristiques



© Sergio Bandeiros

Le raton laveur a la taille d'un gros chat (environ 80 cm) et pèse entre 4 et 9 kg. Les mâles sont habituellement plus grands que les femelles.

Il possède un corps de couleur grisâtre et est réputé grâce à son masque de «bandit» (1) et sa longue queue anelée d'anneaux bruns-noirs (2).

Essentiellement nocturne, un moyen par lequel sa présence peut être repérée, c'est l'observation d'empreintes.

Celles-ci font environ 5 cm et révèlent 5 doigts munis de longues griffes.

Espèces similaires

Parmi les espèces autochtones, il pourrait être confondu avec le putois et le blaireau. Puis, il ressemble également à l'un de ses confrères envahissants: le chien viverrin (*Nyctereutes procyonoides*).

Espèces indigènes

Putois

Mustela putorius putorius

Longueur tête-torse jusqu'à 45 cm.

Poids maximum 1,5 kg.

Face supérieure brun foncé avec des poils laineux translucides blanc-jaune. Masque facial noir, couvrant sans interruption les deux yeux.

Zones blanches autour de la bouche, sur le menton, entre les yeux et sur les oreilles et les bords des oreilles.



© Malene Thyssen

Blaireau

Meles meles

Poids jusqu'à 23 kg.

Bande noire parallèle aux yeux et aux oreilles.

Noir sur la poitrine.

Flancs et dos gris argent.

La queue mesure en moyenne 10 cm.



© Franck Renard

Espèce exotique

Chien viverrin

Nyctereutes procyonoides

Masque moins bien marqué.

Queue courte et de couleur unie.

Pattes courtes.



© Alpsdake

Références et informations complémentaires

Ries, C. & M. Pfeiffenschneider (Eds.), 2021. *Procyon lotor* (Linnaeus, 1758). In: neobiota.lu- Invasive Alien Species in Luxembourg. National Museum of Natural History, Luxembourg. URL: <https://neobiota.lu/procyon-lotor/> [Accessed 2021-01-26].

Schley, L., Herr, J. (2018): *Säugetiere Luxemburgs*. Herausgeber: natur&émwelt a.s.b.l., Ministerium für nachhaltige Entwicklung und Infrastruktur, Naturverwaltung. Imprimerie Hengen Print & More, Luxembourg.

Faune sauvage de France: biologie, habitats et gestion- Michel Vallance

<http://biodiversite.wallonie.be/servlet/Repository?ID=33361>

<https://bretagne-environnement.fr/bilan-chiffre-especes-exotiques-envahissantes-bretagne-datavisualisation>

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polecat_in_denmark.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nyctereutes_procyonoides_viverrinus.jpg



Administration
de la nature et des forêts