GROSSE HUFSENNASE

Rhinolophus ferrumequinum

Grouss Hufeisennues
Grand rhinolophe
Greater horseshoe bat

© Chung CU

Administration
de la nature et des forêts

WAR DIE GROSSE HUFSENNASE HIER?

© Lena Becker

Exkrememente:
Der Kot der Fledermausart ist 1 - 1,5 cm lang, schwarz, länglich, etwa 0,5 cm im Durchmesser.

© Viktor Laki

SINNESORGANE:

Fledermäuse haben von allen Tieren die besten Ohren. Sie dienen den Fledermäusen im Dunkeln als Augen. Die Tiere stoßen auf Nahrungssuche 5 - 20 mal pro Sekunde Töne im Ultraschallbereich aus, also so hoch, dass wir sie nicht hören können. Diese Schallwellen werden zum Beispiel von Beutetieren reflektiert und mit veränderter Tonart zum Fledermausohr zurückgesandt. Diese Töne kann das Fledermausgehirn in Bilder umwandeln.

Die Fledermaus weiß dadurch genau, wie groß und wie weit weg die Beute ist. Fledermausohren funktionieren daher wie Echoortungssysteme, wie sie zum Beispiel auf Schiffen zur Untersuchung des Untergrunds eingesetzt werden.

© Rudmer Zwerver

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Im Juni bringen die Weibchen jeweils 1 nacktes und blindes Jungtier zur Welt. Dieses wird 6-8 Wochen lang gesäugt und kann nach 3-4 Wochen schon fliegen.

Große Hufeisennasen brauchen Sommer- und Winterquartiere. Die Weibchen suchen sich im Frühjahr zudem Wochenstuben, also Quartiere, in denen sie die Jungtiere zur Welt zu bringen und groß ziehen. Die verschiedenen Quartiere müssen ausreichend große Ein- und Ausgänge besitzen, weil Große Hufeisennasen in ihre Quartiere fliegen und nicht kriechen.

© ATTILA Barsan

Sommerquartiere sind Felshöhlen, Stollen oder ähnliche Strukturen. Winterquartiere müssen kühl aber frostsicher sein und sind auch meist Höhlen oder Stollen. Hier halten die Großen Hufeisennasen ihren Winterschlaf. Dabei hängen sie frei an der Decke. Als Wochenstuben dienen Scheunen oder Dachböden großer Gebäude, wie Kirchen.

LEBENSRAUM:

Siedlungen, Wiesen, extensive Weiden, Streuobstwiesen, lichte Wälder und Gebüsche, Hecken

AKTIVITÄTSZEIT:

nachaktiv, halten von Oktober bis April Winterschlaf

GROSSE HUFSENNASE-RÄTSEL

1. Wieso nennt man Große Hufeisennasen Ansitzjäger?
2. Warum brauchen sie Quartiere mit ausreichend großen Eingängen?
3. Wo überwintern Große Hufeisennasen?
4. Was ist das besondere an der Nase?

NATÜRLICHE FEINDE:

Eulen

GEWICHT:

bis 24 g

NAHRUNG:

Mai- und Junikäfer, Nachtfalter und Zweiflügler, v. a. Stechmücken

Große Hufeisennasen jagen in niedrigem Flug oder als Ansitzjäger: Sie hängen sich kopfüber an Äste während sie die Umgebung mit ihren Ultraschallrufen nach Insekten absuchen. Hören sie das Echo, fliegen sie dem Insekt hinterher und erbeuten es und kehren zu dem Ast zurück, um erneut nach Beute Ausschau zu halten.

Ihr Erkennungsmerkmal ist die hufeisenförmige Nase. Mit dieser stoßen sie auch die Ultraschallwellen für die Echolotung aus und können so auch mit Beute im Mund bis zu ihrem Fraßplatz zurückfliegen. Andere Fledermausarten brauchen für die Abgabe der Ultraschallwellen ihren Mund.

Das Fell der Großen Hufeisennasen ist auf dem Rücken braun bis rotbraun, am Bauch grau bis gelblich weiß. Jungtiere sind auf der Oberseite grau.

Die Große Hufeisennase gehört mit 40 cm Flügelspannweite zu den größten Fledermausarten in Luxemburg.

Für die Jagd in abwechslungsreicher Landschaft mit Wiesen, Weiden, Feldern, Hecken, Gebüschen, Waldrändern und Streuobstwiesen, fliegen Große Hufeisennasen schon mal einige Kilometer weit. Jungtiere brauchen Grünflächen mit Hecken und Gebüschen im nahen Umfeld der Wochenstube.

GRÖSSE:

1,80m

7 cm

40 cm Flügelspannweite

© ATTILA Barsan

Beim Schlafen hüllen sich Hufeisennasen in ihre Flughäute ein.

Antworten: 1. Weil sie ihre Beute nicht im Flug, sondern am Baum hängend suchen. 2. Weil sie nicht wie andere Fledermäuse kriechen können, sondern hineinfliegen müssen. 3. In frostsicheren Höhlen und Stollen. 4. Ihre Form, sie ähnelt einem Hufeisen, und dass die große Hufeisennase damit ihre Töne aussendet.

FELDHASE

Lepus europaeus

- Hues
- Lièvre d'Europe
- Brown Hare

© Franek Renard

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

WAR DER FELDHASE HIER?

© Lena Becker

Exkremete:
Feste, etwa 1,5 cm große
Kugeln, die im Winter
hell- bis gelbbraun, im
Sommer dunkel bis fast
schwarz gefärbt sind.

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

© Eugène Reiter

Die Ohren sind an den Spitzen schwarz und länger als der Kopf (bis 14 cm lang).

Zu Hasenohren sagt man auch "Löffel". Hasen hören und riechen sehr gut. Sie können ihre Ohren in alle Richtungen drehen.

Feldhasen sind Einzelgänger und leben die meiste Zeit alleine.

Die Augen sitzen seitlich am Kopf, sodass Hasen fast einen Rundumblick haben. Die Augen sind bernsteinfarben und nicht dunkel wie bei den Kaninchen.

Häsinnen bringen 1-3 mal im Jahr 2-3 Junge zur Welt.

Die Jungtiere sind Nestflüchter und kommen mit offenen Augen und behaart zur Welt. Sie bleiben vom ersten Tag an allein, die Mutter kommt nur zweimal am Tag zum Säugen vorbei.

NAHRUNG:

Gräser und Kräuter, Feldfrüchte, Triebe, Knospen und Blätter, Rinde

Die Art der Nahrung ändert sich im Jahresverlauf. Im Frühjahr und Sommer besteht sie fast nur aus grünen Pflanzenteilen, im Herbst kommen Samen dazu, im Winter auch Holz und Rinde.

LEBENSRAUM:

Wiesen und Felder

AKTIVITÄTSZEIT:

nachtaktiv

Das Fell ist im Sommer gelblich braun, im Winter gräulich braun. Bauch und Schwanzunterseite sind weiß, die Schwanzoberseite leuchtet schwarz.

Mit ihren extrem langen Hinterbeinen können Hasen drei Meter weit und zwei Meter hoch springen und sehr schnelle Richtungswechsel vornehmen, das "Haken schlagen". Hasen können bis zu 80 km/h schnell werden.

Den Schwanz der Hasen nennt man auch Blume.

FELDHASEN-RÄTSEL

1. Wie nennt man es, wenn Hasen auf der Flucht extrem schnell die Richtung wechseln?
2. Wie lang kann ein Hasenohr werden?
3. Warum nennt man Hasenjunge "Nestflüchter"?
4. Was haben Blumen und Löffel mit Hasen zu tun?

NATÜRLICHE FEINDE:

Wildschwein, Fuchs, Greifvögel

GEWICHT:

bis 6 kg

GRÖSSE:

MAUSWIESEL

Mustela nivalis

Maus Wisel
Belette
Mouse weasel

© Michael Meshcheryakov

WAR DAS MAUSWIESEL HIER?

© agrarfoto

Exkremete:
Der Kot des Mauswiesels ist braun, dünn und gedreht. Am Ende bildet er meist eine lange Spitze.

Trittsiegel Vorderpfote

Hinterpfote

Trittsiegel:

Die Trittsiegel des Mauswiesels sieht man selten, am ehesten im Schnee.

Nach einigen Sprüngen verschwindet die Spur dort, wo das Mauswiesel zum Jagen unter dem Schnee weiterläuft.

Baue:

Mauswiesel halten sich vor allem unterirdisch in Mause- und Maulwurfgängen auf, wo sie ihre Beute jagen. Sie nutzen aber auch hohle Baumstämme, Steinhäufen und hohes Gras als Verstecke.

Frasspuren:

Andere Zeichen dafür, dass ein Mauswiesel da war, sind z. B. Nahrungsreste, wie durch am oberen Teil angefressene Eier oder Beutetiere, die am Kopf angefressen sind.

Administration
de la nature et des forêts

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Ab April bringen Mauswiesel bis zu dreimal im Jahr 4-9 Junge zur Welt.

Die Jungen kommen nackt und blind zur Welt, nehmen nach etwa zwei Wochen feste Nahrung auf und sind nach vier Monaten selbstständig.

Die Anzahl der Würfe ist stark vom Nahrungsangebot abhängig. In Jahren mit wenigen Mäusen kann es vorkommen, dass es keinen Mauswieselnachwuchs gibt.

Als Nest nutzt das Weibchen meist verlassene Mäusebaue, die es mit Haaren, Federn und trockenem Laub polstert.

Mauswiesel orientieren sich unterirdisch mit Hilfe ihrer langen Tasthaare.

Ein besonderes Merkmal ist der braune Fleck auf weißem Grund am Mundwinkel.

Mauswiesel sind Einzelgänger und verteidigen ihr Revier gegen Artgenossen.

LEBENSRAUM:

Wiesen und Felder mit Hecken, lichten Gebüsch und Böschungen

AKTIVITÄTSZEIT:

tag- und nachtaktiv

Das Fell ist auf der Oberseite braun und an der Unterseite weiß. Ein wichtiges Merkmal ist die wellenförmige Trennlinie an der Körperseite.

In manchen Gegenden mit kalten Wintern, werden Mauswiesel ab Herbst ganz weiß. In Mitteleuropa behalten sie ihr braunweißes Fellkleid ganzjährig.

Das Mauswiesel ist eng mit dem Hermelin verwandt und sieht diesem mit seinem schlanken Körper auch sehr ähnlich. Im Gegensatz zur Schwanzspitze des etwas größeren Hermelins ist allerdings die Schwanzspitze des Mauswiesels nicht schwarz.

MAUSWIESEL-RÄTSEL

1. Woran kann man das Mauswiesel vom Hermelin unterscheiden?
2. Wo bauen Mauswiesel ihre Nester?
3. Was sind die Hauptbeutetiere von Mauswieseln?
4. Wechseln Mauswiesel im Winter ihre Fellfarbe?

NATÜRLICHE FEINDE:

Marder, Füchse, Greifvögel, Eulen, Hauskatzen

GEWICHT:

bis 120 g (Männchen),

bis 60 g (Weibchen)

Die Männchen werden etwas größer als die Weibchen (bis 20 cm ohne Schwanz).

GRÖSSE:

Antworten: 1. An der Schwanzspitze, die beim Mauswiesel nie schwarz ist. 2. Sie nutzen meist verlassene Mäusebaue. 3. Wie der Name schon sagt, ernähren sich Mauswiesel hauptsächlich von Mäusen. 4. Nein, bei uns in Mitteleuropa behalten sie ihre braun-weißes Fell das ganze Jahr.

ROTFUCHS

Vulpes vulpes

Fuuss
Renard roux
Red Fox

© Olivier Molitor

WAR DER ROTFUCHS HIER?

© FIAH/shutterstock.com

Exkremete:
Bis 10 cm lang, 2 cm dick. Häufig sind im Kot Nahrungsreste wie Haare, Knochenstücke oder Samen sichtbar.

Trittsiegel

Beim normalen Gehen setzt der Fuchs die Füße nahezu in einer Linie voreinander. Die Spur ähnelt einer Perlschnur, die Gangart wird daher als „**Schnüren**“ bezeichnet.

Baue:

Hinweise darauf, ob ein Bau von Füchsen bewohnt wird, sind Knochenreste im Bereich des Eingangs und fächerförmig verteilte Erde vor dem Bau. Dachse schaffen die Erde aus dem Bau weiter weg, **so dass sich vor dem Bau Furchen bilden.**

Sie graben Baue nicht immer selbst sondern nutzen gern die Unterkünfte von Dachsen oder Kaninchen, mit denen sie, wenn der Bau groß genug ist, auch **Wohngemeinschaften** bilden.

© Lena Becker

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Füchse sind äußerst lernfähig und gelten daher als schlau.

Eine weibliche Füchsin nennt man auch **Fähe**.

Eine Füchsin bringt einmal im Jahr 3 - 5 Jungtiere zur Welt.

Füchse können 400mal besser riechen als wir.

Die Jungtiere sind bei der Geburt taub und blind und können die Höhle erst nach vier Wochen verlassen. Nach weiteren drei Monaten sind sie selbstständig und verlassen die Mutter.

© Franck Renard

NAHRUNG:

Füchse sind **Allesfresser** und ernähren sich von dem, was am einfachsten zu bekommen ist: Kleintiere, Würmer, Schnecken, Frösche, Insekten, Eier, Vögel, Früchte, Aas und menschliche Abfälle.

Die Art der Nahrung ändert sich im Jahresverlauf, im Herbst fressen Füchse zum Beispiel mehr Obst als sonst.

Weil Füchse auch Aas fressen und dadurch mögliche Krankheitserreger beseitigen, sind sie sehr nützliche Tiere.

Ein Fuchs kann seine Ohren in **alle Richtungen drehen** und gut erkennen, woher ein Geräusch kommt.

Das Fell ist rotbraun und im Winter deutlich buschiger als im Sommer. Schwanzspitze, Hals, Brust und Bauch sind weiß, Ohrenrückseite und Beine schwarz.

Die Farbe des Fells kann bei Rotfüchsen in anderen Regionen Europas etwas abweichen. Im Norden sind sie meist dunkler, im Süden heller.

LEBENSRAUM:

Wald und Offenlandschaft, heute auch in Dörfern und Städten

AKTIVITÄTSZEIT:

dämmerungs- und nachtaktiv

Füchse sind **Einzelgänger**. Häufig bleibt der Rüde jedoch für die Jungenaufzucht bei der Füchsin, um die Familie mit Nahrung zu versorgen.

ROTFUCHS-RÄTSEL

1. Wie nennt man eine Füchsin noch?
2. Warum klauen Füchse manchmal Hühner?
3. Wie lange bleiben die Jungfüchse bei der Mutter?
4. Wie unterscheidet sich das Winterfell vom Sommerfell?

NATÜRLICHE FEINDE:

Wolf, Uhu

GEWICHT:

bis 9 kg

GRÖSSE:

1,80m

0,50m

Antworten: 1. Fähe / 2. Weil sie das erbeuten, was für sie am einfachsten zu erreichen ist und manchmal sind das Hühner in nicht ausreichend gesicherten Ausläufen. / 3. Etwa vier Monate / 4. Die Haare sind länger und das Fell insgesamt buschiger, daher erscheinen Füchse im Sommer schlanker und kleiner als im Winter.

SIEBENSCHLÄFER

Myoxus glis

- Siweschléifer
- Loir gris
- Fat dormouse

© Miroslav Hlavko

WAR DER SIEBENSCHLÄFER HIER?

**Trittsiegel
Vorderpfote**

Trittsiegel:
Bei den Trittsiegeln der Siebenschläfer sind weder an den Vorder- noch an den Hinterpfoten Krallenabdrücke zu sehen.

Hinterpfote

Spuren finden?

Da sich Siebenschläfer vor allem in Bäumen und Sträuchern aufhalten, sind Spuren selten zu finden. Nur wenn sie ihr Nest auf Dachböden oder in Gartenhäuschen anlegen, können durch das Ausstreuen von Speisemehl Spuren beobachtet werden.

Exkrememente:
Der Kot von Siebenschläfern ist bis 2 cm lang, schwarz, bohnenförmig, etwa 0,5 cm im Durchmesser.

© COULANGES

Für ihren Winterschlaf graben sich Siebenschläfer eine etwa 1 m tiefe Erdhöhle, in die sie sich kugelförmig einrollen.

Administration
de la nature et des forêts

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Im Sommer kommen 4-6 Jungtiere nackt, blind und taub zur Welt. Die Mutter baut in Baumhöhlen, Felsspalten, Nistkästen oder auf Dachböden ein gut gepolstertes Nest. Erst nach etwa sechs Wochen nehmen sie feste Nahrung zu sich, nach acht Wochen sind sie selbstständig.

Siebenschläfer leben alleine. Nur im Sommer, wenn das Weibchen die Jungen großzieht, bildet es mit diesen eine Familiengruppe.

Siebenschläfer finden sich hervorragend im Dunkeln zurecht. Sie können sehr gut hören und riechen und auch ihre großen Augen helfen bei der Orientierung.

LEBENSRAUM:

strukturreiche Laubwälder, Streuobstwiesen, Gärten

AKTIVITÄTSZEIT:

nachaktiv, hält zwischen September und Mai mindestens sieben Monate Winterschlaf (Name)

SIEBENSCHLÄFER-RÄTSEL

1. Wie kommen Siebenschläfer Hauswände rauf und runter?
  2. Wieso nehmen Siebenschläfer vor dem Winter soviel Gewicht zu?
  3. Wofür dient der lange, buschige Schwanz?
1. Warum heißt der Siebenschläfer Siebenschläfer?

Sie besitzen durch die bis zu sechs Zentimeter langen Schnurrhaare sowie Tasthügel im Gesicht und an den Unterarmen einen außergewöhnlichen Tastsinn.

Das Fell ist auf der Oberseite graubraun, am Bauch hell und um die Augen herum dunkel gefärbt.

Siebenschläfer sind sehr gute Kletterer und halten sich selten am Boden auf.

NATÜRLICHE FEINDE:

Eulen, Marder, Mauswiesel, Hauskatzen

GEWICHT:

im Sommer bis 150 g, kurz vor dem Winterschlaf bis 250 gr

GRÖSSE:

bis 19 cm (ohne Schwanz)
Schwanzlänge ca. 17 cm

NAHRUNG:

Früchte, Knospen, Rinde, selten auch Insekten, Vogeleier und Jungvögel.

Im Herbst fressen sie Baumfrüchte wie Bucheckern, Eicheln und Nüsse, um sich ein Fettpolster für den langen Winterschlaf anzulegen. Siebenschläfer können dann bis zu acht Monate ohne Nahrung auskommen.

Die Pfoten der Siebenschläfer sind besonders zum Klettern geeignet. Die Zehen sind lang und gelenkig und die Sohlenballen durch ein Sekret klebrig. Sie funktionieren wie Saugnäpfe, so dass Siebenschläfer sogar senkrechte Wände hochklettern können.

Der Schwanz ist lang und buschig und dient beim Klettern als Gleichgewichtshilfe. Zudem besitzt er eine Sollbruchstelle, an der er bei Gefahr abgeworfen werden kann. So können Siebenschläfer ihren Feinden entweichen.

Antworten: 1. Mit ihm halten die Siebenschläfer beim Klettern das Gleichgewicht. 2. Durch ein Sekret werden die Sohlenballen klebrig und funktionieren wie Saugnäpfe. 3. Weil sie mehr als sieben Monate Winterschlaf halten ohne etwas zu essen. 4. Weil er mindestens sieben Monate Winterschlaf hält.

HAUSSPITZMAUS

Crocidura russula

Hausspitzmaus
Crocidure musette
Greater white-toothed shrew

© Rudmer Zwerver

Administration
de la nature et des forêts

WAR DIE HAUSSPITZMAUS HIER?

bis 1,5 cm
lang

Hauspitzmaus

bis 0,8 cm
lang

Hausmaus

Exkremete:

Der Kot der Spitzmaus ist im Verhältnis zu ihrer Körpergröße außerordentlich groß. Obwohl die Hausspitzmaus vom Kopf bis zur Schwanzwurzel keine 10 cm misst, können ihre Kotpillen 10 bis 15 mm groß werden. Die Hausmaus wird ähnlich groß, ihr Kot ist aber deutlich kleiner.

Trittsiegel Vorderpfote

Hinterpfote

Spurlos?

Die Spuren der Hausspitzmaus sind selten zu finden und auch schwierig von denen anderer Kleinsäuger zu unterscheiden, da sowohl die Trittsiegel als auch die Spur meist nur aus winzigen Ballenabdrücken bestehen.

Nester:

Hausspitzmäuse bauen ein 8 bis 13 cm großes Hauptnest, das mit Gras, Moos und Blättern gepolstert wird und mehrere Ruhenester, die sie mehrmals am Tag aufsuchen. Die Nester liegen unterirdisch oder oberirdisch versteckt unter Steinhaufen oder in Gebäuden.

© FIAH

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

© Zoonar/Hans Peter Eckstein

Eine Hausspitzmaus bringt 1 - 4 mal im Jahr 3 - 6 nackte und blinde Jungtiere zur Welt.

Bis 8 Tage nach der Geburt, trägt die Mutter die Jungen im Maul durch die Gegend. Danach bilden Mutter und Jungtiere Umzugskarawanen, bei denen sich die Tiere am Schwanzansatz im Fell des Vordermanns verbeißen. So geht keins der Jungtiere verloren, wenn die Familie das Nest wechselt.

Hausspitzmäuse nutzen für die Verständigung Duftmarkierungen. Sie können bis zu 70 verschiedene Düfte abgeben, die viele Informationen, wie Geschlecht, Reviergrenzen und die soziale Stellung der jeweiligen Maus vermitteln.

LEBENSRAUM:

Wiesen, Felder, Brachen, Hecken, Waldränder, Parks und Gärten, im Winter auch in Häusern

AKTIVITÄTSZEIT:

Hausspitzmäuse haben keinen ausgeprägten Tag-Nachtrhythmus, sie wechseln mehrmals am Tag zwischen Schlaf- und Aktivitätsphasen.

HAUSSPITZMAUS-RÄTSEL

1. Wie verständigen sich Hausspitzmäuse?
2. Was ist eine Umzugskarawane?
3. Was machen Hausspitzmäuse, bei Nahrungsmangel?
4. Wieviel Gramm nehmen sie täglich an Futter zu sich?

Der Geruchssinn ist außerordentlich gut, Hausspitzmäuse können Beutetiere bis in eine Tiefe von 5 cm erschnüffeln.

Die Schnauze läuft spitz zu und besitzt innen kleine, kegelförmige, spitze Zähne, die zum Knacken von Insektenpanzern geeignet sind.

Das Fell der Hausspitzmaus ist oben grau bis braungrau und wird zum Bauch hin heller. Im Gegensatz zur Feldspitzmaus bildet es keine klare Farbgrünze.

Bei kühlen Temperaturen oder Nahrungsmangel können Spitzmäuse für ein paar Stunden in einen Energiesparmodus wechseln. Dann fahren sie ihre Körpertemperatur auf 18°C herunter und fallen in eine Art Schlaf.

Der fast 5 cm lange Schwanz ist mit kurzen, anliegenden Haaren und einzelnen, längeren, abstehenden Wimpernhaaren besetzt.

NATÜRLICHE FEINDE:

Greifvögel, Eulen, Marder, Wiesel und Katzen

GEWICHT:

bis 15 g

GRÖSSE:

1,80m

4cm

12cm mit Schwanz

NAHRUNG:

Insekten, Asseln, Spinnen, Schnecken und Regenwürmer aber auch junge Mäuse, seltener Aas und Früchte.

Hausspitzmäuse nehmen täglich mehr als die Hälfte ihres eigenen Körpergewichts zu sich, um ihren hohen Energiebedarf zu decken.

Spitzmäuse sind näher mit Igel und Maulwürfen verwandt als mit den eigentlichen Mäusen.

1. Sie verständigen sich durch über 70 Duftmarkierungen. 2. Wenn die Mutter mit den Jungtieren das Nest verlässt, beißen sich die Jungtiere im Fell des Vordermanns fest, um nicht verloren zu gehen. 3. Sie fahren ihre Körpertemperatur herunter und fallen in eine Art Energiespar-Schlaf. 4. Die Hälfte ihres Körpergewichts: 7,25g

ROTHIRSCH

Cervus elaphus

Hirsch
Cerf élaphe
Red Deer

© Franck Renard

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

WAR DER ROTHIRSCH HIER?

Exkremente:
2 bis 2,5 cm lang,
eichelförmig,
Delle am Ende,
Spitze am Anfang

© Emeryk III/shutterstock.com

Trittsiegel

bis 10cm

schnell   langsam

Rennt das Rotwild, z. B. auf der Flucht, werden die beiden Hufe, die sogenannten Schalen, auseinander gedrückt.

Die höher am Fuß sitzenden beiden Zehen, Klauen genannt, berühren nur bei schnellem Gang den Boden und hinterlassen Spuren. Die Klauenspuren sind beim Rotwild im Gegensatz zum Wildschwein nicht breiter als die Abdrücke der Hufe (Schalen).

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Männliche Rothirsche tragen ein Geweih, das sie jedes Jahr zwischen Februar und April verlieren. **Innerhalb von 140 Tagen wächst ein neues Geweih.**

Jede Geweihstange kann bis zu **7 kg** schwer werden und bis zu 10 Enden bekommen. Das Geweih besteht aus dem gleichen Material wie Knochen.

Ohne Geweih kann man den Hirsch durch seine massive Brust und den mächtigen Hals von der Hirschkuh unterscheiden.

Eine Hirschkuh bekommt einmal im Jahr 1-2 Junge.

© Franck Renard

NAHRUNG:

Pflanzen: Gräser, Kräuter, junge Triebe, Bucheckern, Eicheln, Kastanien, Früchte, Baumrinde.

Die Art der Nahrung ändert sich im Jahresverlauf.

LEBENSRAUM:

Wald

AKTIVITÄTSZEIT:

ursprünglich tagaktiv, heute eher nachtaktiv

Auch die weiblichen Tiere nennt man **Rothirsch bzw. Hirschkuh** und nicht, wie oftmals gedacht, Reh.

ROTHIRSCH-RÄTSEL

1. Tragen alle Rothirsche Geweihe?
2. Wie lange wächst ein Geweih?
3. Wieviele Jungtiere bekommt eine Hirschkuh im Jahr?
4. Warum heisst der Rothirsch "Rothirsch"?

NATÜRLICHE FEINDE:

Wolf

GEWICHT:

bis 250 kg

bis 130 kg

GRÖSSE:

1,80m

bis 1,50m

bis 1,20m

Antworten: 1. Nein, nur die männlichen Tiere. / 2. Es wächst etwa 140 Tage, bis zu zwei Zentimeter pro Tag und ist bereits Ende Juli wieder fertig. / 3. 1-2 Jungtiere. / 4. Weil das Sommerfell eine rötliche Farbe hat.

WILDKANINCHEN

Oryctolagus cuniculus

Wëllkanéngchen
Lapin de garenne
Rabbit

© Eugène Reiter

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

WAR DAS WILDKANINCHEN HIER?

© guenthermaeus/
shutterstock.com

Exkremente:
Der Kot der
Wildkaninchen ist
kugelförmig mit etwa
1 cm Durchmesser
und häufig in größeren
Mengen zu finden.

Trittsiegel
Vorderpfote

Hinterpfote

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Kaninchen sind nur entfernt mit den Feldhasen verwandt und unterscheiden sich von diesen:

- sie sind deutlich kleiner
- sie haben kürzere Ohren
- sie haben dunkle Augen
- sie sind nicht menschen scheu und leben häufig in Siedlungen
- sie sind sehr gesellig, leben in Kolonien und graben bis zu 50 m lange und 3 m tiefe, unterirdische Baue
- ihre Jungen sind Nesthocker und bleiben noch 3-4 Wochen nach der Geburt in ihrer Höhle

Die Weibchen bringen bis zu dreimal im Jahr durchschnittlich je 4-6 Junge in einer eigens dafür gegrabenen Setzhöhle zur Welt.

Kaninchen können sich zwar stark vermehren, sind aber immer wieder durch verschiedene Krankheiten gefährdet, an denen große Teile der Population sterben.

Augen sitzen seitlich am Kopf, daher haben sie einen nahezu **vollständigen Rundumblick**.

LEBENSRAUM:

Waldränder, Grün- und Parkanlagen

AKTIVITÄTSZEIT:

dämmerungsaktiv

WILDKANINCHEN-RÄTSEL

1. Wie unterscheiden sich Wildkaninchen äußerlich von Feldhasen?
2. Wie oft kann ein Kaninchenweibchen im Jahr Junge bekommen?
3. Wie nennt man die Höhle, in der die Jungen zur Welt gebracht werden?

Der Schwanz ist auf der Unterseite weiß.

Ihre Hinterbeine ermöglichen ihnen hohe und weite Sprünge sowie schnelle Richtungswechsel und **Geschwindigkeiten bis 50 km/h**.

NAHRUNG:

Pflanzen: Gräser, Kräuter, Blätter, Zweige, Rinde, Knospen, Getreidekörner, Feldfrüchte
Die Art der Nahrung ändert sich im Jahresverlauf.

© Franck Renard

NATÜRLICHE FEINDE:

Fuchs, Marder, Wolf, Greifvögel, Wildschwein

GEWICHT:

1,3 - 2 kg

GRÖSSE:

WOLF

Canis lupus

Wollef
Loup
Wolf

© Eugène Reiter

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Administration de la nature et des forêts

WAR DER WOLF HIER?

Wolfsspuren sind schwer zu erkennen und man findet sie nur sehr selten.

© Ralph Manz

Exkremete:
15-20 cm lang,
2-4 cm dick,
wurstförmig.
Enthalten meist Haare
und Knochenreste.

Um die Fährte eines Wolfs von der eines Hundes unterscheiden zu können, muss diese mehrere hundert Meter lang sein. Im Unterschied zum Hund ist sie meist geradlinig, nicht zickzackförmig.

Die Pfotenabdrücke bilden ungefähr eine Linie, die Abdrücke der Hinterpfoten werden genau in die Abdrücke der Vorderpfoten gesetzt.

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Wölfe hören Töne, die für uns nicht hörbar sind und können ihre Artgenossen **in bis zu 10 km Entfernung** heulen hören.

Sie können Beutetiere und Artgenossen **bis 2 km weit erreichen**.

Wölfe haben einen Blickwinkel von 250° und können Dinge wahrnehmen, die leicht hinter ihnen sind.

Kopf dunkel mit hellen Stellen an den Seiten

LEBENSRAUM:

unterschiedlich, wichtig: ausreichend Beutetiere und Verstecke

AKTIVITÄTSZEIT:

dämmerungs- und nachaktiv

Rudel leben in etwa 200 km² großen Revieren, die durch Kot, Urin und das **typische Wolfsgeheul** markiert werden. Sie legen etwa 20 km pro Tag zurück.

WOLF-RÄTSEL

1. Warum heulen Wölfe?
2. Wie weit können Wölfe das Wolfsgeheul von Artgenossen hören?
3. Wie unterscheidet sich der Wolfskot vom Hundekot?

NATÜRLICHE FEINDE:

keine

GEWICHT:

Rüde bis 60 kg

Weibchen bis 40 kg

GRÖSSE:

NAHRUNG:

Rehe, Wildschweine, Rothirsche, Hasen, Mäuse, auch Insekten und Aas. Ein Wolf kann tagelang gar nichts fressen und dann bis 15 kg auf einmal.

© A. von Dueren/shutterstock.com

Schwanzspitze dunkel

- Wölfe stehen in Luxemburg unter Schutz.
- Wölfe leben in Rudeln aus einem Elternpaar und dessen Nachwuchs. Nach 1 - 2 Jahren verlässt der Nachwuchs das Rudel.
- Wölfe sind für gewöhnlich sehr scheu und vermeiden den direkten Kontakt mit Menschen.
- Wölfe sind mit unseren Haushunden verwandt und gehören zur gleichen Art.

Einmal im Jahr kommen 4 - 6 Junge auf die Welt. In jedem Rudel bekommt nur eine Wölfin Junge. Sie wird bei der Aufzucht von den anderen Rudelmitgliedern unterstützt.

IGEL

Erinaceus europaeus

Kéisecker
Hérisson d'Europe
Western Hedgehog

© Raymond Gibden

WAR DER IGEL HIER?

Exkremente:
Die bis 4 cm langen
schwarz glänzenden
Kotwürste sind an
einem Ende spitz und
enthalten häufig Reste
von Insekten oder
Früchten.
Findet man selten.

Trittsiegel
Vorderpfote

An den Vorder- und
Hinterfüßen besitzt
er jeweils fünf Zehen
wobei die Vorderpfote
dickere und stärker
gespreizte Zehen
aufweist

Hinterpfote

Igel gehen wie wir
Menschen auf der
ganzen Fußsohle.
Das machen nur sehr
wenige Tiere.

TIPP

Wer Igel einen Schlafplatz
für den Winter bieten
möchte, braucht einen
Holzstapel, einen großen
Reisighaufen oder einen
Steinhaufen, unter dem es
den ganzen Winter über
trocken bleibt. Ideal sind
auch spezielle Igelhäuser.

Wenn ihr einen Igel findet,
der offensichtlich Hilfe
benötigt, solltet ihr euch an
eine der Wildtier-Stationen
in Luxemburg wenden:
26 51 39 90

Auf keinen Fall dürfen
Igel Milch bekommen! Sie
trinken Wasser und dürfen
Katzen- oder Hundefutter
fressen.

© slowmotiongl/
shutterstock.com

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Igel sind **Einzelgänger**, auch die Jungen zieht die Igelmutter alleine auf.

Eine Igelin bringt einmal im Jahr im Sommer 4-5 Jungtiere zur Welt. Bei der Geburt sind sie taub und blind, sie werden 6 Wochen gesäugt, beginnen aber schon mit vier Wochen selbst mit der Nahrungssuche, mit sechs Wochen sind sie selbstständig.

© Yulia YasPel / shutterstock.com

Igel können sehr laut sein. Nachts kann man sie beim Fressen schmatzen hören oder laut fauchen und schreien, wenn sie auf Artgenossen oder Feinde treffen.

Für die Jungenaufzucht baut die Igelin ein Nest aus Moos und Gras unter Holzstapeln, Gartenhäuschen oder Reisighaufen. **Wer Igel in seinem Garten haben möchte**, muss einen Durchschlupf im Zaun lassen, damit sie rein und wieder raus kommen.

Igel hören sehr gut und nehmen auch so hohe Töne wahr, die für uns nicht mehr hörbar sind.

NAHRUNG:

Insekten, Würmer, Schnecken, Eier, Aas, Fallobst und Jungtiere von kleinen Säugetieren wie Mäusen.

Die Art der Nahrung ändert sich im Jahresverlauf. Im Herbst fressen sich Igel ein Fettpolster für den Winterschlaf an.

Im Winterschlaf können Igel ein halbes Jahr ohne etwas zu essen überleben.

Igel finden Ihre Nahrung vor allem mit Ihrem guten Geruchssinn.

Igel haben mehr Zähne als wir Menschen, nämlich 36.

LEBENSRAUM:

Hecken, Streuobstwiesen, Ränder von Laubwäldern, naturnahe Gärten und Parks, wenig bewirtschaftete Wiesen.

AKTIVITÄTSZEIT:

nachtaktiv, hält Winterschlaf von November bis April

IGEL-RÄTSEL

1. Was machen Igel bei Gefahr?
2. Dürfen Igel Milch trinken?
3. Wieviele Stacheln hat ein Igel?
4. Wie lange macht ein Igel Winterschlaf?

NATÜRLICHE FEINDE:

Dachs, Fuchs, Marder, Uhu

GEWICHT:

bis 2 kg

GRÖSSE:

Ein Igel besitzt mehr als 5000 Stacheln, bei der Geburt sind es bereits etwa 100 Stacheln. Sie schützen die Igel vor Fressfeinden. Bei Gefahr rollen sich die Igel zu einer stacheligen Kugel zusammen.

3. Mehr als 5000 Stacheln. / 4. 5 - 6 Monate.
Antworten: 1. Sie rollen sich zu einer stacheligen Kugel zusammen. / 2. Nein, nur Wasser. /

REH

Capreolus capreolus

- Rei
- Chevreuil européen
- Roe Deer

© Eugène Reiter

WAR DAS REHWILD HIER?

© Lena Becker

Exkremente:
Zylindrisch bis kugelförmig, bis 1,4 cm lang und 1 cm breit, ein Ende rund, das andere spitz.

Trittsiegel
ca 5 cm

Wenn Rehe schnell rennen, drücken sich hinter den beiden Hufteilen auch die weiter oben am Bein sitzenden Zehen in den Boden. Im Gegensatz zu den Abdrücken von Wildschweinen sind sie nicht breiter als die Hufabdrücke.

langsam

schnell
Wenn Rehe flüchten, werden die beiden Hufe (Schalen) auseinandergedrückt.

Ricke und **Bock**

...kann man durch die verschieden geformten weißen Flecken am Hinterteil unterscheiden. Im Winter sind die sogenannten Spiegel deutlicher, da sie im Winterfell weiß, im Sommer eher gelblich sind.

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

Böcke tragen ein Gehörn aus Knochenmaterial, das sie zwischen Oktober und Dezember abwerfen. Es beginnt sofort wieder zu wachsen.

Eine Ricke bringt einmal im Jahr 1- 2, selten 3 Kitze zur Welt.

Die Jungtiere liegen in den ersten Lebenswochen allein, meist im hohen Gras. Dort sind sie besonders durch die Mahd gefährdet, weil sie bei Gefahr nicht flüchten, sondern liegen bleiben und sich tot stellen (Totstellreflex). Die Mutter kommt zwei bis dreimal am Tag zum Säugen, ist aber nie weit entfernt.

© Franck Renard

NAHRUNG:

Rehe sind Feinschmecker und essen vor allem junge und frische Pflanzenteile: Kräuter, frisches Gras, Knospen und junge Triebe, im Sommer und Herbst auch Blätter und Früchte.

Im Winter suchen sie ihre Nahrung mehr auf Wiesen und Feldern.

Die weiblichen Rehe nennt man "Ricken", die männlichen "Böcke" und die Jungtiere "Kitze".

Rehe besitzen einen ausgeprägten Geruchsinn und können z. B. Menschen auf mehr als 300 Meter wittern.

LEBENSRAUM:

Wald und Wiesen, im Winter auch auf Feldern

AKTIVITÄTSZEIT:

dämmerungsaktiv

Im Herbst wechseln die Rehe ihr rotbraunes Sommerfell zum graubraunen Winterfell. Die einzelnen Haare des Winterfells sind zur besseren Isolierung hohl.

REHWILD-RÄTSEL

1. Wie nennt man ein weibliches Reh und wie ein männliches?
2. Wie heißt der weiße Fleck am Hinterteil?
3. Was ist ein Totstellreflex?

NATÜRLICHE FEINDE:

Wolf, Fuchs, Wildschwein

GEWICHT:

20 - 25 kg

GRÖSSE:

1,80m

0,80m

EICHHÖRNCHEN

Sciurus vulgaris

Kaweechelchen
Écureuil roux
Red Squirrel

© Raymond Gloden

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

WAR DAS EICHHÖRNCHEN HIER?

Exkremente:
Ähnlich dem des Igels.
Etwas kleiner, fest und
trocken, nicht glänzend
und kann Nahrungsreste
wie Samen, Nussstücke
oder Pilze enthalten.

Trittsiegel
vorne

hinten

Beim schnellen Hoppeln
werden die Hinterpfoten
vor die Vorderpfoten
gesetzt.

© Lena Becker

Kobel:

Eichhörnchen bauen hoch oben in Bäumen mehrere runde, 30–50 cm große Nesthöhlen aus Ästen und Zweigen, sogenannte Kobel. Von innen mit Moos ausgepolstert, dienen sie zum Schlafen, als Geburtsstätte und als Ort für die Winterruhe.

Fraßspuren:

Zapfen knabbern Eichhörnchen im Vergleich zu Feldmäusen weniger ordentlich ab, so dass sie ausgefranst erscheinen. Sie liegen meist gehäuft an erhöhten Stellen, wie auf Steinen oder Baumstämmen. Nüsse knacken Eichhörnchen so, dass zwei gleichgroße Schalenhälften entstehen.

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Eichhörnchen stehen in Luxemburg unter Schutz.

Eichhörnchen sind Einzelgänger.

Eichhörnchen bringen einmal, in nahrungsreichen Jahren auch zweimal, 3-4 Junge zur Welt. Sie werden nackt, blind und taub geboren und bleiben mindestens sechs Wochen im Kobel.

Eichhörnchen legen sich für den **Winter Futtevvorräte** an, die sie vergraben und durch ihren Geruchsinn wiederfinden. Aus Samen, die nicht wiedergefunden werden, entwickeln sich neue Pflanzen.

NAHRUNG:

Eichhörnchen sind **Allesfresser**, die sich je nach Jahreszeit von Nüssen, Früchten und Samen oder von Knospen, Blättern, Trieben, Pilzen, Insekten sowie Eiern und Jungvögeln ernähren.

Ihr Essen halten Eichhörnchen in ihren Vorderpfoten wie in Händen.

Eichhörnchen haben einen sehr feinen Tastsinn.

Eichhörnchen können bis zu fünf Meter weit springen.

Durch ihre besonderen Kletter- und Sprungfähigkeiten sind Eichhörnchen in der Lage, ebenfalls kletternden Fressfeinden entkommen zu können.

Besondere Merkmale der Eichhörnchen sind der buschige, bis 25 cm lange Schwanz und ihre Pinselohren und ihre Pinselohren im Winter.

Das Fell ist rötlich, die Bauchunterseite weiß oder cremefarben.

LEBENSRAUM:

Wald, auch in Parkanlagen und naturnahen Gärten

AKTIVITÄTSZEIT:

tagaktiv, hält in kalten Wintern Winterruhe, in der es den Kobel nur alle paar Tage verlässt, um sich an seinen Futtevvorräten zu bedienen.

EICHHÖRNCHEN-RÄTSEL

1. Wie heißen die Nester der Eichhörnchen?
2. Halten Eichhörnchen Winterschlaf?
3. Woran erkennt man, dass ein Eichhörnchen einen Zapfen abgeknabbert hat?

NATÜRLICHE FEINDE:

Baummarder, Katzen

GEWICHT:

bis 400 g

GRÖSSE:

Der Schwanz dient Eichhörnchen als Gleichgewichtshilfe beim Klettern, als Steuerruder beim Springen und zur Kommunikation.

Die langen Hinterbeine sind perfekt zum Klettern, ebenso wie die langen, beweglichen Zehen an Vorder- und Hinterpfoten, mit denen sie kopfüber einen Stamm hinunterlaufen können.

© Eugène Reiter

ZWERGFLIEDERMAUS

Pipistrellus pipistrellus

- Zwergfledermaus
- Pipistrelle commune
- Common Pipistrelle

© Olivier Molitor

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

WAR DIE ZWERGFLIEDERMAUS HIER?

© Lena Becker

Exkremente:
Je nach Sommerquartier der Zwergfledermäuse lässt sich unterhalb des Schlafplatzes Kot finden. Dieser ähnelt dem Mäusekot, zerfällt aber leicht, da er aus den unverdaulichen Chitinpanzern von Fliegen, ihrer Hauptnahrung besteht.

SINNESORGANE:

Fledermäuse haben von allen Tieren die besten Ohren. Sie dienen den Fledermäusen im Dunkeln als Augen. Die Tiere stoßen auf Nahrungssuche 5 - 20 mal pro Sekunde Töne im Ultraschallbereich aus, also so hoch, dass wir sie nicht hören können. Diese Schallwellen werden zum Beispiel von Beutetieren reflektiert und mit veränderter Wellenlänge zum Fledermausohr zurückgesandt. Weil die zurückgeworfenen Schallwellen unterschiedlich schnell an den Fledermausohren ankommen, kann die Zwergfledermaus räumlich hören.

Anhand dieser Töne, also des Echos, weiß die Fledermaus genau, wie groß und wie weit die Beute weg ist. Fledermausohren funktionieren daher wie Echoortungssysteme, wie sie zum Beispiel auf Schiffen zur Untersuchung der Wassertiefe eingesetzt werden.

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Fledermäuse brauchen **Sommerquartiere**, in denen sie tagsüber schlafen und **Winterquartiere**, in denen sie ihren Winterschlaf halten. Bei Zwergfledermäusen liegen die beiden Quartiere nicht weit voneinander entfernt. Andere Arten legen über 1000 km zurück, um vom Sommer- ins Winterquartier zu wechseln.

Um ihren Nachwuchs zu bekommen, finden sich etwa **50 bis 100 Weibchen ab Ende April in einem Quartier zusammen**, wo sie gemeinsam ihre Jungtiere großziehen. Dabei benötigen sie nur wenig Platz: 50 Fledermausmütter würden bequem in einen Schuhkarton passen. Ende Juli, Anfang August werden die **Wochenstuben** wieder verlassen. Zwergfledermausweibchen kehren immer in die Wochenstube zurück, in der sie selbst geboren wurden.

Zwergfledermäuse nutzen unter anderem Rolllädenkästen und Spalten zwischen Dachziegeln oder hinter Verkleidungen als **Sommerquartiere und Wochenstuben**. Auch natürliche Quartiere wie alte Bäume oder Felsspalten werden genutzt. Ihre Jagdgebiete, insektenreiche Gärten oder Parks, müssen sich in unmittelbarer Nähe befinden. Als **Winterquartiere** dienen ebenfalls Verkleidungen von Hausfassaden oder Spalten in Felsen, Höhlen, Stollen oder Kellern.

LEBENSRAUM:

Siedlungen, Wälder mit Gewässern

AKTIVITÄTSZEIT:

nachaktiv, halten von November bis April Winterschlaf

Das Fell der Zwergfledermaus ist auf der Oberseite rotbraun bis dunkelbraun, auf der Unterseite gelbbraun bis graubraun.

FLEDERMAUS-RÄTSEL

1. Wie groß ist eine Zwergfledermaus in etwa?
2. Warum hängen Fledermäuse beim Schlafen kopfüber?
3. Was ist eine Wochenstube?
4. Wie orientieren sich Fledermäuse mit ihren Ohren?

NATÜRLICHE FEINDE:

Marder, Greifvögel, Eulen, Hauskatzen

GEWICHT:

bis 7 g

GRÖSSE:

1,80m

4,5 cm lang,
25 cm
Flügelspannweite

Der Körper einer Zwergfledermaus ist etwa so groß wie eine Streichholzsachtel.

Im Juni bringen Fledermausweibchen in den Wochenstuben jeweils 1-2 nackte, blinde Jungtiere zur Welt. Nach vier Wochen können die Jungtiere fliegen, werden aber noch 2-3 Wochen von ihrer Mutter gesäugt.

NAHRUNG:

Insekten, vor allem Mücken, Fliegen und Nachtfalter; Eine Fledermaus frisst in einer Nacht mehrere Tausend Insekten, das entspricht einem Drittel ihres Körpergewichts.

Fledermäuse hängen sich zum Schlafen und Ausruhen **kopfüber an Wände**, Decken oder Bäume. Dabei halten sie sich mit den Krallen ihrer Füße fest. Das Besondere ist, dass die Füße der Fledermäuse nach hinten zeigen. Durch das Gewicht der Fledermäuse werden die Krallen automatisch gekrümmt, sodass sie auch im Tiefschlaf an den Wänden hängen bleiben und so vor ihren Fressfeinden sicher sind.

Die Flügel der Fledermäuse bestehen aus der Flughaut, die sich zwischen dem Körper, dem Unter- und Oberarm und zwischen den Fingern spannt. Die Haut zwischen Schwanz und Hinterbeinen nennt man Schwanzflughaut.

DACHS

Meles meles

- Duess
- Blaireau européen
- Badger

© Franck Renard

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

WAR DER DACHS HIER?

Exkremete:
Dachse graben kleine, etwa 10 cm tiefe Gruben, sogenannte Latrinen, in denen sie ihren Kot absetzen.

Trittsiegel
Vorne

Dachse besitzen an jeder Pfote fünf Krallen, wobei die der Vorderpfoten auffallend groß und lang sind.

Hinten

Beim Gehen drehen sie ihre Vorderpfoten leicht einwärts.

Dachsbau

Dachse graben große Baue, die bis zu 5 m tief und 30 m im Durchmesser sein können und mehrere Etagen aufweisen. Die Baue können mehr als 20 Eingänge haben und sind durch die typische ovale Form der Eingänge erkennbar. Gelegentlich werden die Baue mit Füchsen geteilt.

Dachse nutzen die Baue zum Schlafen und als Geburtsstätte. Sie halten ihre "Dachsburgen" sauber und verrichten ihr Geschäft nur außerhalb. Auch Moos, Farn und Gras, das sie zur Polsterung verwenden, wird regelmäßig ausgetauscht.

© Axelle Bonbled

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Dachse leben in **Familiengruppen** zusammen, die aus dem Elternpaar und den Jungtieren aus diesem und dem letzten Jahr bestehen.

Eine Däxsin bringt im Januar oder Februar 2-4 Jungtiere zur Welt, die zwar blind aber bereits behaart sind. Sie verlassen erst mit zwei Monaten den Bau und bleiben zwei Jahre bei der Familie.

Dachse können gut riechen und finden mit ihrer Nase auch Nahrung unter der Erde.

NAHRUNG:

Als **Allesfresser** ernähren sie sich von Früchten, Beeren, Getreidekörnern, Regenwürmern, Käfern, Larven, Schnecken, Amphibien, kleinen Nagetieren, Eiern, Pilzen und Wurzeln.

Die Art der Nahrung ändert sich im Jahresverlauf.

Dachse stehen in Luxemburg unter Schutz.

© Jan Herr

Typisches Merkmal der Dachse ist ihre **Gesichtsmaske**. Über der weißen Grundfarbe verlaufen zwei schwarze Streifen von den Mundwinkeln nach oben über die Augen bis zu den Ohren.

Die Körperform ist an das Leben in Bauen angepasst. Der Körper ist flach, der Kopf klein, die Beine sind kurz aber kräftig und ihre Vorderpfoten besitzen zum Graben lange Krallen.

LEBENSRAUM:

Wald, Hecken, Felder

AKTIVITÄTSZEIT:

dämmerungs- und nachtaktiv; hält Winterruhe und verlässt den Bau nur gelegentlich, um etwas zu essen.

DACHS-RÄTSEL

1. Wie werden Dachsbau auch genannt?
2. Warum haben Dachse große Vorderpfoten mit langen Krallen?
3. Was sind Latrinen?

NATÜRLICHE FEINDE:

Wolf

GEWICHT:

bis 23 kg

GRÖSSE:

1,80m

0,40 m

STEINMARDER

Martes foina

Steemarder
Fouine
Beech Marten

© Raymond Gloden

WAR DER STEINMARDER HIER?

© FIAH/shutterstock.com

Exkremente:
Bis 10 cm lange und bis 2 cm dicke Würste, ein Ende oft mit gedrehter Spitze, enthalten Reste von Obstkernen, Haaren und Federn. Marder legen manchmal "Toilettenplätze" an, die sie immer wieder aufsuchen.

Trittsiegel
vorne

hinten

Marder bewegen sich meist hüpfend fort. In der Fährte sitzen die Hinterlaufabdrücke genau in den Spuren der Vorderläufe.

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Steinmarder sind Einzelgänger, die ihr Revier gegen Artgenossen verteidigen. Es wird vermutet, dass Marder in Autos immer wieder Schaden anrichten, wenn diese nach fremden Artgenossen riechen.

Typisch für Steinmarder ist der **große weiße Kehlfleck, weshalb er auch "Weißkehlchen" genannt wird.** Der ähnlich aussehende Baummarder hat einen gelb-orangen Kehlfleck, der auch nicht bis auf die Vorderbeine reicht.

© Vaclav Sebek / shutterstock.com

Ein Steinmarderweibchen bringt einmal im Jahr 2-4 Junge zur Welt.

Die Jungen sind bei der Geburt nackt, blind und taub. Kommen sie auf Dachböden zur Welt, treiben sie jedoch bald die menschlichen Bewohner in den Wahnsinn. Bis drei Monate lang verlassen sie das Quartier nicht und machen nachts Radau, so dass die anderen Hausbewohner kaum schlafen können.

NAHRUNG:

Steinmarder sind Allesfresser: Früchte, Kleintiere, vor allem Mäuse und Vögel, Eier, Nahrungsreste von Menschen und Insekten

Steinmarder sind gute Kletterer, die sogar an Hauswänden hochklettern können.

LEBENSRAUM:

Dörfer und Städte, Wald, Felder und Wiesen

AKTIVITÄTSZEIT:

dämmerungs- und nachaktiv

Steinmarder besitzen mehrere Quartiere, in denen sie tagsüber schlafen und die sie regelmäßig wechseln. Sie befinden sich auf Dachböden, in Scheunen, Holzstapeln, Baumhöhlen oder Krähenestern.

STEINMARDER-RÄTSEL

1. Wodurch unterscheiden sich Steinmarder und Baummarder?
2. Wo leben Steinmarder?
3. Steinmarder machen aus menschlicher Sicht viel Unsinn, warum?

NATÜRLICHE FEINDE:

Greifvögel

GEWICHT:

bis 2,3 kg

GRÖSSE:

Steinmarder dringen auch in nicht ausreichend gesicherte Vogelställe ein, um sich dort zum Beispiel ein Huhn zu klauen. Beginnen die Vögel aus Angst umherzuflattern, löst

das beim Marder einen **Beutefanginstinkt** aus, der erst wieder aufhört, wenn alle Tiere tot sind. Marder sind also keinesfalls blutrünstige Monster, die aus purer Lust Beute töten.

Antworten: 1. Der Kehlfleck der Steinmarder ist weiß und reicht bis auf die Vorderbeine, der der Baummarder ist gelblich und kleiner. / 2. Im Wald aber auch sehr gerne in Menschennähe, wie auf Dachböden oder in Schuppen und Scheunen. / 3. Weil Jungtiere in Sommerächten in ihrem Quartier auf Dachböden umhertollen und Marder in Autos Schaden anrichten, weil diese nach fremden Mardern riechen.

BIBER

Castor fiber

- Biber
- Castor d'Eurasie
- European Beaver

© Franck Renard

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

WAR DER BIBER HIER?

Charakteristisch ist die Spur, die der breite Schwanz hinterlässt.

© Laurent Schley

Fraßspuren:

Biber benagen dickere Stämme in etwa 50 cm Höhe rundherum. So entsteht die typische Eieruhrform. Beim Nagen haken sie die oberen Schneidezähne ein und raspeln mit den unteren Zähnen. Die Späne sind etwa 10 cm lang und 3-4 cm breit.

Durch den Dammbau und das Fällen von Bäumen gestalten Biber Gewässerlandschaften um und schaffen vielfältige Lebensraumstrukturen.

Biberburg:

Biber verbringen die Tage in Bauen, die sie in Uferböschungen graben oder in Biberburgen, riesigen Asthaufen mit einem sogenannten Kessel, der sich erhöht im Trockenen befindet. Die Eingänge der Biberbehausungen liegen immer unter Wasser.

Exkrememente:

Biberkot findet man selten bis gar nicht, da Biber ins Wasser koten.

© Franck Renard

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

HUMAN
MADE

Texte und Illustrationen: hum.lu

Ein Biberweibchen bringt einmal im Jahr 1-3 Junge zur Welt.

Biber leben in Familiengruppen mit 2-8 Tieren zusammen, zu denen die Elterntiere, die Jungtiere des aktuellen Jahres und die Jungtiere des letzten Jahres gehören. Ihr Revier wird gegen Artgenossen verteidigt.

Biber haben als Nagetiere sehr kräftige Vorderzähne, mit denen sie Bäume bis 1m Dicke fällen können. Die Zähne sind gelb, weil der Zahnschmelz Eisenoxid enthält, der die Zähne, die ein Leben lang wachsen, noch härter macht.

© Vaclav Sebek / shutterstock.com

Die Vorderpfoten werden ähnlich wie Hände zum Greifen benutzt und besitzen einen feinen Tastsinn. Auch zum Graben werden die Vorderpfoten eingesetzt.

NAHRUNG:

Biber sind strenge Vegetarier und ernähren sich von Frühjahr bis Herbst von Gräsern, Kräutern und Blättern, im Winter von Rinde und Knospen.

Biber können bis zu 15 Minuten unter Wasser bleiben. Ohren und Nasenlöcher können beim Tauchen verschlossen werden.

Biber besitzen einen sehr guten Geruchssinn, mit dem sie prüfen, ob Nahrung genießbar ist und mit dem sie Feinde frühzeitig wittern. Auch ihr Gehör ist gut ausgeprägt, so dass sie zum Beispiel in der Lage sind, undichte Stellen im Damm zu "erhören".

Die Hinterpfoten sind länger als die Vorderpfoten und sie sind zwischen den langen Zehen mit Schwimmhäuten versehen. Sie dienen im Wasser als Paddel, an Land helfen die Krallen beim Erklimmen steiler Uferböschungen.

Damit das Fell nicht durchnässt, wird es mit einem Öl, das die Tiere am Körper produzieren, regelmäßig gepflegt.

Biber erkennt man an ihrem typischen großen, flachen Schwanz, der "Kelle". Er wird als Ruder beim Schwimmen und Tauchen benutzt, an Land dient er als Balancierhilfe.

LEBENSRAUM:

Gewässer aller Art

AKTIVITÄTSZEIT:

dämmerungs- und nachaktiv

Mit ihren Tasthaaren im Gesicht können sie sich auch im Dunkeln unter Wasser fortbewegen ohne irgendwo anzustoßen.

BIBER-RÄTSEL

1. Wie nennt man den Biberschwanz?
2. Wie heißen die Asthaufen, in denen Biber den Tag verbringen?
3. Wie bemerken Biber undichte Stellen im Damm?

NATÜRLICHE FEINDE:

Fuchs, Uhu, Raubfische

GEWICHT:

bis 30 kg

GRÖSSE:

1,80m

0,40m

MAULWURF

Talpa europaea

Maulef, Maulwuerf

Taupe d'Europe

Common Mole

© Carmen Ribab/shutterstock.com

WAR DER MAULWURF HIER?

© fotografos/shutterstock.com

Maulwurfshügel:

Maulwürfe hinterlassen keine sichtbaren Fährten oder Exkreme. Ihre Anwesenheit wird durch die typischen Erdhügel auf Wiesen und Rasenflächen offensichtlich, die sie beim Graben ihrer Gangsysteme anhäufen. Die Hügel unterscheiden sich zu denen der Schermaus durch ihre mittig gelegenen Eingänge und die Größe der Hügel.

Maulwürfe verbringen fast ihr ganzes Leben unter der Erde. Dort graben sie Gangsysteme von mehreren Hundert Metern Länge. Sie bestehen aus verschiedenen Kammern; zum Beispiel zum Schlafen, als Vorrats- oder Geburtskammer und Jagdgängen.

Jagdgänge können bis zu 100 Meter lang sein. Die Maulwürfe gehen sie alle paar Stunden ab und kontrollieren sie auf herabgefallene Regenwürmer oder Larven. Beute, die sie nicht sofort essen, wird mit einem Biss gelähmt und in eine Vorratskammer gebracht.

Maulwürfe sind trotz des Hügelbaus Nützlingle, den sie vertilgen Schädlinge, wie wurzelfressende Insektenlarven und lockern den Boden.

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

An den rüsselähnlichen Nasen und an den Schwänzen der Maulwürfe befinden sich spezielle Tasthaare, mit denen sie sich unter der Erde orientieren und Beutetiere finden können.

© Carmen Rieb/shutterstock.com

Ein Maulwurfweibchen bringt einmal im Jahr 2-5 blinde und nackte Junge zur Welt. Sie bleiben etwa zwei Monate bei der Mutter.

Mit ihren sehr kleinen Augen können Maulwürfe nur helle und dunkle Schatten erkennen.

Maulwürfe besitzen ein sehr dichtes, samtartiges Fell, das sie wärmt, aber keinen Dreck aufnimmt.

Die Haut an der Nase hat fünfmal mehr Nervenfasern als unsere Hand und wird "Eimersches Organ" genannt. Mit ihr können Maulwürfe sogar Bewegungen von Beutetieren wahrnehmen. Außerdem besitzen sie ein sehr gutes Gehör und einen guten Geruchssinn.

NAHRUNG:

Regenwürmer, Insektenlarven und selten Mäuse

Sehr auffällig sind die schaufelartigen Vorderpfoten der Maulwürfe, die sie zum Graben nutzen.

LEBENSRAUM:

Wälder, Wiesen, Parks und Gärten

AKTIVITÄTSZEIT:

Maulwürfe besitzen keinen Tag-Nacht-Rhythmus

MAULWURF-RÄTSEL

1. Wie orientieren sich Maulwürfe in den dunklen Gängen?
2. Warum haben Maulwürfe so ein dichtes Fell?
3. Was ist ein Jagdgang?
4. Fressen Maulwürfe Wurzeln und Pflanzen?

NATÜRLICHE FEINDE:

Fuchs, Wildschwein, Eulen, Greifvögel

GEWICHT:

bis 130 g

GRÖSSE:

Maulwürfe sind Einzelgänger. Ihre Reviere, die so groß sein können, wie ein halbes Fußballfeld, verteidigen sie vehement gegen Artgenossen.

Antworten: 1. Mit ihren Tasthaaren an Nase und Schwanz, mit dem "Eimerschen Organ" und mit ihrem sehr guten Gehör. 2. Es hält sie warm und lässt Schmutz und Wasser abperlen. 3. Nein, sie sind reine Fleischfresser.

WILDSCHWEIN

Sus scrofa

Wëllschwäin/Wëllt Schwäin

Sanglier

Wild Boar

© Franck Renard

WAR DAS WILDSCHWEIN HIER?

© Lena Becker

Exkremete:
Knöllchen, die meist
zusammenkleben und
eine Wurst formen.

Im Unterschied zu Rehen
und Rothirschen, bilden
sich die hinteren Zehen bei
den Wildschweinen immer
ab und ragen im Abdruck
über die Breite der Hufab-
drücke hinaus

Beim langsamen
Gehen setzen
Wildschweine
ihre Hinterfüße in
die Abdrücke der
Vorderfüße. Deshalb
sieht es aus, als hätten
sie hinten vier Zehen.

Wühlspuren:
Auf der Suche nach Würmern
und anderen kleinen Tieren oder
Wurzeln, schieben Wildschweine
sogar feste Grasnarben mit ihren
Nasen weg. So entstehen typische
Bilder von umgegrabenen
Wiesen, oft auch an Weg- und
Straßenrändern.

Suhlen:
Im Wald kann man Matschkuhlen
finden, in denen sich
Wildschweine wälzen, um sich zu
kühlen und Parasiten wie Mücken
oder Läuse loszuwerden.

© Randy van Domselaar/shutterstock.com

Malbäume:
Wildschweine lieben es, ihren
Körper an Bäumen mit grober
Rinde zu scheuern. Dabei
nutzen sie häufig den selben
Baum, der im unteren Bereich
auffällige Matschspuren aufweist.
Manchmal ist auch die Rinde
etwas abgeschabt.

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Die Bache bringt einmal im Jahr 2 - 8 Junge zur Welt. Bei milden Wintern und großem Nahrungsangebot kann es auch mehrere Würfe im Jahr geben.

Die Bachen leben mit ihren Jungen in einer Rotte, junge Männchen leben später in Junggesellengruppen zusammen, bevor sie als ausgewachsene Keiler alleine umherziehen.

© Eugène Reiter

Die Frischlinge kommen sehend und behaart auf die Welt. Charakteristisch sind die hellen Streifen durch die die Frischlinge bestens getarnt sind. Da Bachen ihre Jungtiere bei Gefahr verteidigen, ist **besondere Vorsicht** geboten.

LEBENSRAUM:

ursprünglich große Waldgebiete, heute auch Felder und Wiesen und zweitweise sogar Siedlungsbereiche

AKTIVITÄTSZEIT:

eigentlich tagaktiv, bei vielen Waldbesuchern und Jagden eher nachtaktiv

WILDSCHWEIN-RÄTSEL

1. Warum werden Wildschweine auch Schwarzwild genannt?
2. Wie heißen die Jungtiere der Wildschweine?
3. Wie nennt man die weiblichen Wildschweine?
4. Warum pflügen Wildschweine Wiesen und Wegränder um?

Besonders gut entwickelt sind der Hör- und vor allem der Geruchssinn. Mit ihrer rüsselähnlichen Nase erschnüffeln Wildschweine Würmer und Larven sogar unter der Erde.

Die **Eckzähne** (20 cm) der Wildschweine sind vor allem bei den Keilern sehr lang und ausgesprochen scharf. Sie dienen als Waffe, die unter anderem bei Rankenkämpfen genutzt wird.

NAHRUNG:

Wildschweine sind **Allesfresser**: Eicheln, Bucheckern, Wurzeln, Fallobst, Getreide, Rüben, Pilze, Insekten, Würmer, Schnecken, Amphibien, Reptilien, Aas, Jungtiere von kleinen Säugetieren.

Die Art der Nahrung ändert sich im Jahresverlauf.

Der keilförmige Kopf und der gedrungene Körper der Wildschweine ermöglichen ein schnelles Durchschlüpfen durch dichtes Unterholz.

Trotz ihres massigen Körpers können Wildschweine sehr schnell rennen und auf kurzen Strecken **Geschwindigkeiten von bis zu 50 km/h** erreichen.

NATÜRLICHE FEINDE:

Fuchs, Wolf

GEWICHT:

Bache bis 110 kg

Keiler bis 160 kg

GRÖSSE:

1,80m

1,00m

Antworten: 1. Weil ihnen nach etwa einem Jahr ein dunkelgraues bis schwarzes, borstiges Fell wächst. / 2. Frischlinge / 3. Bachen / 4. Weil sie unter der Erdoberfläche nach Larven, Würmern und Wurzeln suchen, die sie mit ihrem guten Geruchssinn erschnüffeln.

WILDKATZE

Felis silvestris

Wëllkaz/Wëll Kaz
Chat sauvage
Wildcat

© Jean-Luc Brausch

WAR DIE WILDKATZE HIER?

Weil Wildkatzen so scheu sind und man kaum Spuren findet und auch nicht mit bloßem Auge von den Spuren der Hauskatzen unterscheiden kann, kann man ihre Anwesenheit nur schwer nachweisen.

Man macht dies mit einem Trick: mit Baldrian besprühte **Lockstäbe** werden in den Waldboden gesteckt. Die Katzen werden von dem Geruch angelockt und scheuern sich daran. Dabei bleiben Haare hängen, die eingesammelt und untersucht werden können.

© Marc Moes

Exkrememente:
Ähnlich denen der Hauskatze, 4 - 8 cm lang, 1,5 cm dick, häufig mit Beuteresten. Schwer zu finden, weil Kot häufig verbuddelt wird.

Trittsiegel

Die Trittsiegel und Spuren gleichen denen von Hauskatzen und sind nicht zu unterscheiden.

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Wildkatzen stehen in Luxemburg unter Naturschutz.

Wildkatzen haben ein **sehr gutes Gehör** und können ihre Ohren unabhängig voneinander in fast alle Richtungen bewegen. So können sie auch im Dunkeln genau erkennen, wo sich ein Beutetier befindet.

Wildkatzen waren in Luxemburg mal fast ausgerottet, der Bestand hat sich aber in den letzten Jahrzehnten erholt. Heute kommt die Wildkatze wieder in ganz Luxemburg vor, auch wenn man sie kaum zu Gesicht bekommt.

Wildkatzen sind **nicht direkt mit unseren Hauskatzen verwandt**, die von der Afrikanischen Wildkatze abstammen, können sich aber trotzdem mit ihnen paaren und Junge bekommen.

Die Katze bringt einmal im Jahr 2-4 Junge zur Welt. Sterben die Jungtiere, kann es im gleichen Jahr zu einem weiteren Wurf kommen.

Die Katzenjungen werden blind aber behaart in Baum- oder Erdhöhlen geboren.

© Adil Baghli

NAHRUNG:

Kleinsäuger, Reptilien, Amphibien, Fische, selten Vögel, Kaninchen und Jungtiere von Hasen

Wildkatzen sind **Einzelgänger**, die in großen Gebieten umherstreifen. Die Streifgebiete der Kater sind mit bis zu 3.000 Hektar etwa so groß wie die von Rothirschen, die der Katzen sind nur 300 bis 800 Hektar groß.

LEBENSRAUM:

Wald

AKTIVITÄTSZEIT:

dämmerungs- und nachtaktiv

Wildkatzen ruhen tagsüber in Baumhöhlen, Felshöhlen oder -spalten, Reisighaufen, Holzpoltern oder auch in Dachs- oder Fuchsbauen.

WILDKATZEN-RÄTSEL

1. Stammen unsere Hauskatzen von der Europäischen Wildkatze ab?
2. Wie unterscheiden sich Wildkatzen von getigerten Hauskatzen?
3. Was sind Lockstäbe?

NATÜRLICHE FEINDE:

Dachs, Fuchs, Marder, Uhu

GEWICHT:

bis 10 kg

GRÖSSE:

Antworten: 1. Nein, sie stammen von der afrikanischen Falbkatze ab und wurden von den Römern nach Europa gebracht. / 2. Sie haben fleischfarbene Nasen, ihr Schwanz ist dicker, endet stumpf und hat 3 - 5 deutliche schwarze Ringe, der schwarze Aalstrich auf dem Rücken endet an der Schwanzwurzel. / 3. Frosen, die im Wald in den Boden gerammt werden. Die Wildkatzen reiben sich an den Stöcken und hinterlassen Haare, die untersucht werden um ihre Anwesenheit nachzuweisen.

FELDMAUS

Microtus arvalis

Feldmaus
Campagnol des champs
Common Vole

© Agami Photo Agency/shutterstock.com

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable

Administration de la nature et des forêts

WAR DIE FELDMAUS HIER?

Anhand einer Spur oder von Exkrementen kann man natürlich nicht erkennen, welche Mausart diese hinterlassen hat. Eindeutiger zu bestimmen ist die Feldmaus durch ihre Laufrippen, die man zum Beispiel auf Wiesen finden kann.

Trittsiegel Vorne

Hinten

© Lena Becker

Gänge und Löcher:

Feldmäuse hinterlassen keine Erdhügel, sondern Gangsysteme aus halboffenen Laufrippen. Die Rinnen verbinden zahlreiche 3-4 cm große Löcher miteinander, die in den unterirdischen Teil führen. Die unterirdischen Tunnel liegen in 40-60 cm Tiefe.

Die vielen Ein- und Ausgänge sind dafür da, dass die Feldmäuse bei der oberirdischen Futtersuche schnell verschwinden können, wenn Gefahr droht.

Nagespuren:

1,5 mm breit und an Stämmen bis in eine Höhe von etwa 12 cm.

Weitere Informationen im Buch

"Säugetiere Luxemburgs", L. SCHLEY & J. HERR, (2018), ISBN 978-2-9199511-0-9

Eine Feldmaus bringt 2-3 Mal im Jahr 3-8 Jungtiere zur Welt.

Feldmäuse kommen nackt und blind zur Welt und werden etwa 12 Tage gesäugt. Bereits im Alter von 13 Tagen können Feldmäuse schwanger werden.

© Kuttelvaserova Stuchelova / shutterstock.com

Alle 3-5 Jahre kommt es in trockenen, nahrungsreichen Zeiten zu einer Massenvermehrung der Feldmäuse und dadurch zu Schäden auf Wiesen und Feldern. Die Vorteile dieser "Mäusejahre" liegen bei den zahlreichen Fressfeinden, wie Füchsen oder Greifvögeln, die dann ein großes Nahrungsangebot haben.

Augen und Ohren der Feldmäuse sind im Vergleich zu Hausmäusen relativ klein.

LEBENSRAUM:

Wiesen und Felder

AKTIVITÄTSZEIT:

Feldmäuse haben keinen Tag-Nachtrhythmus, sie wechseln etwa alle zwei Stunden zwischen Ruhe- und Bewegungsphasen.

FELDMAUS-RÄTSEL

1. Was ist ein Mäusejahr?
2. Woran unterscheidet man Feldmäuse von Hausmäusen?
3. Sind Feldmäuse tag- oder nachtaktiv?

NATÜRLICHE FEINDE:

Fuchs, Marder, Wiesel, Eulen, Greifvögel, Wildschwein, Katze, Maulwurf

GEWICHT:

bis 40 g

GRÖSSE:

Das Fell ist an der Oberseite braun und an den Seiten und am Bauch heller.

Der Schwanz ist einfarbig und im Gegensatz zu dem der Hausmaus deutlich kürzer als der Körper.

Feldmäuse leben in großen Gruppen, sogenannten Kolonien.

NAHRUNG:

Gräser, Kräuter, Samen, Feldfrüchte, Insekten, im Winter auch Wurzeln und Rinde